

Brokuł - Technologia Platynowa

Technologia platynowa Nawożenie brokułu

Produkty rekomendowane przez ekspertów EKOPLON



MAXIMUS PLATINUM extra P 3-4 kg/ha
+ **MAXIMUS AminoMicro** Universal 0,3-0,5 kg/ha

EKOLIST mono Molibden
0,2-0,4 l/ha



MAXIMUS PLATINUM extra PKMg 3-4 kg/ha
Lub **MAXIMUS PLATINUM** extra PK 3-4 kg/ha



MAXIMUS PLATINUM 20+20+20 3-4 kg/ha
+ **MAXIMUS AminoMicro** Universal 0,3-0,5 kg/ha

EKOLIST mono Bor 1-2 l/ha
+ **EKOLIST** mono Molibden
0,2-0,4 l/ha



MAXIMUS PLATINUM extra S 2-3 kg/ha



MAXIMUS PLATINUM extra K 3-5 kg/ha



Zaufaj ekspertom. Zaufaj EKOPLON.

Powyższa technologia została przygotowana jako jeden z kilku możliwych wariantów dla optymalnego odżywienia upraw i ma charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem.

Po posadzeniu rozsady, po przyjęciu się roślin 4 tygodnie po posadzeniu rozsady



MAXIMUS Platinum extra P



MAXIMUS Platinum extra S



MAXIMUS AminoMicro



EKOLIST mono Molibden

2 tygodnie po przyjęciu się rozsady



EKOLIST mono Molibden



EKOLIST mono Bor

W okresie formowania się róży



MAXIMUS Platinum extra PKMg



MAXIMUS Platinum extra K



MAXIMUS Platinum extra PK

3 tygodnie po posadzeniu rozsady



MAXIMUS Platinum 20+20+20



MAXIMUS AminoMicro