СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

МОЛОКО P NON GMO

Это отличный компонент для составления полнопорционных смесей типа престартер и стартер. Это отличный источник лактозы, высокоусваиваемого белка и жира. Благодаря добавлению сахаров, способствует усвоению поросятами корма. Использование стабилизатора флоры кишечника улучшает пищеварение поросят и повышает безопасность корма.

ДОЗИРОВКА

10 -15% в кормах типа престартер, 5 - 10% в кормах стартер. В качестве пойла для поросят после растворения в теплой воде (40 - 45°C). - при кормлении многочисленных пометов в соотношении 1:7 - при безмолочности (ММА) или падежа свиноматки 1:5

БЕЛКОВЫЙ МИКС

Концентрат высоко усваиваемого белка. Для производства кормов типа престартер и стартер фермерами самостоятельно. Благодаря содержанию сбалансированных источников белка (концентрата соевого белка, картофельного белка) и продуктам молочного происхождения повышается усвоение корма. Это отражается на темпах прироста и развитии поросят. Применен специальный аромат, сахар и подсластители для улучшения вкусовых качеств, благодаря чему поросята быстрее набирают вес. Благодаря высокой концентрации энергии облегчает сбалансирование корма.

ДОЗИРОВКА

В качестве белкового компонента в количестве 15% в кормах типа престартер.

COCTAB	ЕД. ИЗМ.	MIX BIAŁKOWY	MLEKO P NON GMO
Сырой белок	r	370	210
Лизин	r	34	17,5
Метионин	r	5	7,2
Треонин	r	15,5	8
Триптофан	r	4,3	3
Лактоза	r	130	350
Кальций	r	3	8,5
Фосфор	r	5,6	6,5
Натрий	r	3,3	5
Сырое волокно	r	17	8
Метаболическая энергия	МДж	18,5	16

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДАННОМ ПРОДУКТЕ МОЖНО УЗНАТЬ У СВОЕГО ДИСТРИБЬЮТОРА

ЛИБИДО

Специализированная кормовая добавка для животных, выращиваемых для разведения. Либидо - это комплекс витаминов и активных веществ. Бета-каротин стимулирует плодовитость свиней. Либидо, благодаря содержанию витамина С смягчает последствия теплового стресса в период жары. Нормализует процесс течки у свиноматок.

ДОЗИРОВКА

СВИНОМАТКИ 2 - 6 КГ/1Т ММР 3 /4 НЕДЕЛИ ДО ПОКРЫТИЯ СВИНОМАТКИ И КАБАНЫ — 2 - 4 КГ/ 1Т МРР КАБАНЫ — 4 - 6 КГ/ 1Т МРР

БУТИРАТ ПЛЮС

Композиция органических кислот - бутирата и активных флавоноидов (полифенолов). Обеспечивает здоровый кишечник, восстановление ворсинок кишечника и эффективное усвоение питательных компонентов корма. Запах бутирата привлекает свиней и способствует лучшему потреблению корма. Полифенолы и витамин С ограничивают окислительный стресс и укрепляют иммунитет.

ДОЗИРОВКА

EKOPLON

КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩ<mark>ЕСТВ</mark> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

28-225, ШИДЛУВ ГРАБКИ-ДУЖЕ, 82

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

+48 41 354 51 69

WWW.EKOPLON.PL

SEKRETARIAT@EKOPLON.PL

1 кг/ 1 тону МРР Упаковка: пакеты 1 кг и 25 кг Бутират ПЛЮС содержит: - активные флавоноиды — 25000 мг

- витамин C — 25000 мг







НАЙТИ НАС НА:







ТЕЛЕФОН ИНФЛОЛИНИИ +48 885 121 095 инфолиния понедельник - пятница (8-16)

ДОБАВКИ







ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ



ЗДОРОВОЕ СТАДО



МИНЕРАЛЬНЫЕ И МИНЕРАЛЬНО-ВИТАМИННЫЕ СМЕСИ

EKOMIX N MIX VIT

Минерально-витаминные смеси для составления кормов. Отлично подходят в качестве дополнения витаминов и минералов. Ароматическая добавка стимулирует животных потреблять больше корма. Благодаря малым упаковкам 2 кг, 4 кг и 25 кг, это отличное решение для заводчиков, которые имеют небольшие хозяйства.

EKO-FORMOS и EKOFOS

Минеральная добавка для добавления в корм для всех групп животных. Ароматическая добавка стимулирует животных потреблять больше корма.

ПОДКИСЛИТЕЛЬ

EKOCID FORTE

Подкислитель для кормов для животных. Продукт на основе кислот: муравьиной, ортофосфорной, уксусной, лимонной и сорбиновой кислот. Продукт эффективно смягчает и предотвращает нарушения в работе пищеварительной системе молодых особей, особенно в период стресса, например, отъем от свиноматки, смена помещения и т.д. Благодаря такой композиции кислот, оказывает широкое антибактериальное действие на ряд микроорганизмов и улучшает процессы пищеварения.

ДОЗИРОВКА

Поросята — 4 - 6 кг/т МРР Свиноматки и кабаны — 2-3 кг/т МРР.

EKOCID

Подкислитель для кормов для животных. Продукт содержит смесь кислот: ортофосфорной, лимонной, фумаровой и яблочной. Отлично подходит в качестве консерванта для кормов, снижает развитие патогенной бактериальной флоры, грибков и плесени.

ЛОЗИРОВК

Поросята — 4 - 6 кг/т МРР Свиноматки и кабаны — 2 - 4 кг/т МРР.

МИКОСОРБЕНТЫ

МИКОСОРБЕНТ

Это кормовая добавка для предотвращения отправления микотоксинами. Благодаря содержанию маннанов, оказывает благоприятное действие на пищеварительную систему. Пребиотическое действие благоприятно влияет на свиноматок и поросят. Добавление эндосперма расторопши поддерживает правильное функционирование печени. Микросорбент улучшает использование корма и повышает иммунитет животных. Особенно рекомендован для защиты основного стада (свиноматки и самцы), а также поросят.

ДОЗИРОВКА

Дозировка — 2 кг/ 1 т корма.

SORBIX 3D

Препарат, который связывает микотоксины в кормах для животных. Благоприятно влияет на уменьшение концентрации аммиака в помещениях, благодаря чему способствует снижению возбудимости и агрессивности животных.

ДОЗИРОВКА

Поросята / свиньи (до 1 г<mark>ода) 1 - 1,5%</mark> Свиноматки / борова 1,5 - 2%.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

DEZYNFEX S

Это антибактериальный препарат в виде порошка широкого действия для сухой дезинфекции помещений. Препарат отлично подходит для дезинфекции помещений с большой концентрацией животных. Можно использовать в присутствии животных.

ДОЗИРОВКА

50 - 100 г препарата на 1 м2

BACTO STOP CYNK i BACTO STOP CEC

Предназначен для поросят в период отъема от свиноматки, используется профилактически при изменении питания, при нарушениях баланса популяции кишечных микроорганизмов. Васто Stop Cynk содержит 60% оксида цинка. Васто Stop СЕС содержит 14% цинка, частично в хелатной форме, обогащен биостимулятором ЖКТ.

COCTAB	ЕД. ИЗМ.	EKOMIX PWT 4 - 2%	EKOMIX LPK 2,5 - 3,5%	MIX - VIT M	MIX - VIT PW	MIX-VIT TT	EKO - FORMOS	EKOFOS
Лизин	r	30	11	11	25	20		
Метионин		3	1	1,6	3	0		
Треонин		5	3	0	0	0		
Кальций (Са)		216	243	270	245	278	280	282
Фосфор (Р)		51	34	30	30	20	40	19
łатрий (Na)		51	55	49	39	30	30	57
Магний (Mg)		10	15	5	5	6	20	25,7
Цинк (Zn)	МГ	2 400	2 600	1 400	1 250	1 200	600	
Ларганец (Mn)	МГ	1 200	1 180	500	600	400	800	
Келезо (Fe)	МГ	2 400	2 360	1 500	1 250	1 100	800	
Ледь (Cu)	МГ	100	380	220	500	220	210	
lод (I)	МГ	20	30	15	8	10	50	
елен (Se)	МГ	6	8	6	5	3	10	
Витамин А	j.m.	250 000	230 000	195 000	200 000	115 000		
Витамин D3	j.m.	47 500	40 000	35 000	40 000	25 000		
ит. Е + полифенолы (эквив. вит.	Ејулг	2 000	1 000	1 000	1 000	850		
итамин КЗ	МГ	60	40	30	33	30		
итамин В1	МГ	40	39	20	29	15		
итамин В2	МГ	150	120	70	83	30		
итамин В6	МГ	80	80	40	50	30		
итамин В12	mcg	500	800	600	330	200		
Никотиновая кислота (вит.B3)	МГ	500	420	300	450	200		
иотин (вит. Н)	mcg	3 000	3 500	3 000	1 500	1 000		
Оолиевая кислота (вит.В9)	МГ	40	60	82	13	15		
-пантотенат кальция	МГ	275	272	262	160	100		
Витамин С	МГ	250	0	0	250	0		
олина хлорид	МГ	6 000	0	0	2 520	0		
иостимулятор		+						
ромат		+	+	+	+	+	+	+
О итаза		+		+				
Дозировка		поросята 4% свиньи (до 1 года) до 12 недель 3% борова 2%	холостые и низкопорсные свиноматки 2,5%, высокопоросные и кормящие свиноматки 3 - 3,5%	супоросные и кормящие свиноматки 4%	поросята и свиньи до 1 года 4	боровы 4%	поросята и свиньи до 1 года 20 — 30 г/шт./день борова и свиноматки 40 — 60 г/шт./день	свиньи до 1 года 16 — 30 кг - 10 — 1 г/шт./день, бо ровы 15 — 30 г/шт./ден свиноматки и кабаны 40-80 г/шт./день